

AVERTISSEMENTS AGRICOLES

PUBLICATION PÉRIODIQUE

ÉDITION DE LA STATION DE L'ILE DE FRANCE

(SEINE, SEINE-ET-OISE, SEINE-ET-MARNE, EURE-ET-LOIR, EURE, OISE)

Régisseur de recettes de la Protection des Végétaux, 31, quai Voltaire, PARIS-7° - BAB. 48-38
C. C. P. PARIS 9063-96

DLP 27-4-61 071608

BULLETIN
TECHNIQUE
DES
STATIONS
D'AVERTISSEMENTS
AGRICOLES

ABONNEMENT ANNUEL

12 NF

Supplément n° 2 au
Bulletin n° 7

25 Avril 1961

AVERTISSEMENTS

TAVELURES DU POMMIER ET DU POIRIER

CULTURES FRUITIERES

Le nombre des périthèces mûrs est toujours important. Quelques taches ont été observées récemment, d'autres risquent d'apparaître prochainement. De plus, la végétation a évolué depuis le 15 avril et le traitement a été en partie lavé. En conséquence un nouveau traitement devra être appliqué :

- Vergers traités aux environs du 10 avril : dès réception du présent avis ,
- Vergers traités du 15 au 17 avril : du 28 au 30 avril inclus .

INFORMATIONS

CULTURES FRUITIERES

PUCERONS - PSYLLES - ACARIENS

Activité très importante dans certains vergers. Dans la plupart des plantations les premières pontes d'acariens vont être déposées prochainement. Intervenir dès que possible. Contre les psylles, les insecticides de contact semblent être plus efficaces.

OIDIUM DU POMMIER

Chaque fois que cela est possible, supprimer les pousses attaquées (provenant des bourgeons infestés l'année dernière). Assurer la protection des pousses saines.

OIDIUM

VIGNE

Appliquer un premier traitement sur tous les cépages sensibles.

BETTERAVES

PUCERONS - PEGOMYIES

L'évolution des pucerons reste lente; par contre la Pégomyie est plus dangereuse. Les mines sont devenues plus nombreuses et les dégâts, surtout dans les betteraves les plus hâtives commencent à devenir sérieux tout au moins dans les champs les plus attaqués. D'autres pontes parfois importantes ont été déposées. Les vols se poursuivent. Actuellement seules les betteraves les plus hâtives nécessitent une application, si toutefois les éclosions sont importantes. Ce traitement devra permettre de détruire à la fois les larves présentes et celles qui pourraient éclore prochainement et tuer éventuellement les pucerons.

REMARQUE - Contre les pucerons de la betterave peuvent être également employés : (en matière active par Hl.) Nicotine (150 g.) - Parathion éthyle (20 g.) - Parathion méthyle (30 g.) - Lindane émulsion (30 g.) - Malathion (75 g.) - Diazinon (25 g.) - Isolan (6 g.)

CULTURES MARAICHIERES

PUCERONS

Ces insectes ont été observés sur certaines plantes maraichères (carottes, tomates) employer soit un produit de contact soit si la végétation est active, la Phosdrine.

L'Ingénieur et l'Agent technique
chargés des Avertissements Agricoles,
H. SIMON et R. MERLING.

L'Inspecteur
de la Protection des Végétaux,
G. BERGER.

Imprimerie de la Station de l'Ile de France-Directeur Gérant : L. Bouyx
31, Quai Voltaire-Paris-(7°).